

ផ្លូវស៊ីលពពួកខ្យង Worthenia

នៅភ្នំបាក់ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

អត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយនេះនឹងបង្ហាញអំពីវត្តមានផ្លូវស៊ីលពពួកខ្យង Worthenia (Class¹ Gastropoda²) ដែលរកឃើញនៅភ្នំបាក់ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ផ្លូវស៊ីលពពួកខ្យង Worthenia ជាផ្លូវស៊ីលខ្យងមួយប្រភេទ នៅក្នុងចំណោមផ្លូវស៊ីលជាច្រើនទៀតដែលបានរកឃើញនៅស្ថានីយភ្នំបាក់។ ខ្យង Worthenia ជាពពួកខ្យងរស់នៅទឹកប្រៃ មានរូបរាងថ្នាក់ដូចកោដ្ឋ ឬហៅថា «turban-shaped shell» (រូបលេខ១)។

ខ្យង Worthenia ត្រូវបានរកឃើញនៅស្ថានីយមួយចំនួនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ មានដូចជា ភ្នំដូងព្រះ ភ្នំកន្ទួត និងភ្នំបាក់ជាដើម។ ពិតណាស់ថាផ្លូវស៊ីលប្រភេទនេះពុំមែនជាផ្លូវស៊ីលដែលទើបនឹងរកឃើញដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលអាចឱ្យយើងសិក្សាស្វែងយល់អំពីអាយុកាល និងបរិស្ថាននៅជុំវិញទីតាំងដែលបានរកឃើញដូចជា៖ តើពីអតីតកាលទីតាំងនោះជាដីគោក ឬក្នុងទឹក (ទឹកសាប ឬទឹកប្រៃជាដើម) តាមរយៈសំណាកផ្លូវស៊ីលដែលបានរកឃើញ។ តើពពួកខ្យង Worthenia នៅភ្នំបាក់មានរូបរាងដូចម្តេច មានអាយុកាលចាប់ពីពេលណាមក? នៅបន្ត

¹ Class ប្រែថា «ថ្នាក់», បើនិយាយនៅក្នុងបាសាលាវិទ្យា (Paleontology) ពាក្យនេះប្រើសម្រាប់បែងចែកក្រុម ឬប្រភេទមនុស្ស សត្វ រុក្ខជាតិ (Taxonomy)។ ឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថា «ខ្យង» គឺចែកជាច្រើនប្រភេទទៀតដូចជាខ្យងហ៊ាន ខ្យងសោក ខ្យងប័រ ខ្យងទទឹម ខ្យងអត់សំបក និងខ្យងដែលទើបនឹងរកឃើញថ្មីឈ្មោះថា ឧទយាទិត្យ (Clostophis udayaditinus) នៅខេត្តបាត់ដំបងក្នុងឆ្នាំ២០២៥ជាដើម។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតអំពីខ្យងរកឃើញថ្មីនេះ សូមអាន ព្រឹត្តិបត្រ សុខុម, ២០២៥

² Gastropoda ជាពាក្យដែលមានប្រភពមកពីក្រិចបុរាណសំដៅលើអម្បូរខ្យងទាំងពួងរាប់ទាំងនៅលើគោក ទាំងនៅក្នុងទឹក

រស់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃដែរឬទេ? ដូច្នេះដើម្បីអាចឆ្លើយទៅនឹងសំណួរខាងលើបាន ខ្ញុំ សូមលើកយកផ្លូវស៊ីល ខ្យង Worthenia នៅភ្នំបាក់មកបង្ហាញដូចតទៅនេះ។

ស្ថានីយផ្លូវស៊ីលសត្វសមុទ្រភ្នំបាក់ មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លា ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចម្ងាយប្រហែល ៣៦៥ គ.ម. ភាគពាយ័ព្យពីទីក្រុងភ្នំពេញ (រូបលេខ២-៥)។ ស្ថានីយភ្នំបាក់ជាប្រភេទភ្នំថ្មកំបោរដែលក្រុមការងារស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងបរិស្ថានបានចុះទៅសិក្សាកាលពីឆ្នាំ២០១៩^៣ ហើយបានប្រទះឃើញសំណាកផ្លូវស៊ីលជាច្រើនប្រភេទដូចជាពពួក Brachiopods, ផ្កាថ្ម (Coral), ពពួកផ្កាសមុទ្រ (Crinoids ឬ Sea Lilies), ពពួកខ្យង (Gastropods), ពពួកគ្រី (Bivalvia), ពពួកមីក (Cephalopods), ពពួកកាំប្រម៉ាសមុទ្រ (Echinodermata), ពពួក Bryozoa និងផ្លូវស៊ីលឈើ (Fossil Wood) ជាដើម^៤ ដែលអម្បូរសត្វទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាសត្វរស់នៅក្នុងទឹកសមុទ្រ។ បើយោងទៅតាមផែនទីភូគព្ភសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញថា ភ្នំបាក់មានលេខកូដ PLS (Permian Lime Stone) ស្ថិតនៅស័ក Paleozoic ក្នុងសម័យកាល Permian ដែលមានអាយុកាលចន្លោះពី ២៩៩ - ២៥១ លានឆ្នាំមុន^៥ (រូបលេខ៦)។ នៅក្នុងកំណត់ត្រាផ្លូវស៊ីល ខ្យង Worthenia មានវត្តមានចាប់តាំងពីសម័យកាល Devonian អាយុកាលប្រហែល ៤១៦លានឆ្នាំមុន និងបានផុតពូជនៅសម័យកាល Triassic អាយុកាលប្រហែល ២០០លានឆ្នាំមុន^៦។ អម្បូរខ្យងប្រភេទនេះដែលធ្លាប់បានរកឃើញនៅភ្នំបាក់មានទំហំជាធម្មតាចន្លោះពី 2.5 cm ដល់ 11.5 cm ដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងបែកចែកចំណាត់ថ្នាក់ខាងក្រោម។

^៣ លីម វណ្ណច័ន្ទ, ២០២១, ទំ.១៣
^៤ លីម វណ្ណច័ន្ទ, ២០២១, ទំ.១២
^៥ Geological Map of Cambodia, 2010

^៦ Britannica. "Worthenia." Accessed August 15, 2026. <https://www.britannica.com/animal/Worthenia>.

តារាងបែងចែកចំណាត់ថ្នាក់នៃពពួកខ្យង Worthenia នៅភ្នំបាក់ (រូបលេខ៧)

ចំណាត់ថ្នាក់ (Taxonomy)	ភាសាបរទេស	ភាសាខ្មែរ
រដ្ឋ: (Kingdom)	Animalia	សត្វ
សាខា (Phylum)	Mollusca	សិប្បីសត្វ
ថ្នាក់ (Class)	Gastropoda	ខ្យង
លំដាប់ (Order)	Trochonematoidea	?
សន្តាន (Family)	Lophospiridae	?
ពួក (Genus)	Worthenia ⁷	?
ប្រភេទ (Species)	?	?

បរិយាយ៖

- ទំហំ ៖ សំណាក A1-A3: (11.5×9.7×11.5) cm, សំណាក B1-B3: (2.5×2.2×2.8) cm
- ពណ៌នា៖ សំណាកខ្យងទាំងពីរនេះប្រហែលជាពូជតែមួយដ្បិតបើសិនជាពិនិត្យមើលទៅលើរូបរាងរបស់វាទាំងពីរយើងឃើញថាមានលក្ខណៈដូចគ្នាខ្លាំងត្រង់ថាមានរង្វង់ព័ទ្ធមកស្តាំចំនួន៥គន្លាក់ដូចគ្នា ខុសគ្នាតែទំហំប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែនេះក៏អាចដោយហេតុថាមួយចាស់មួយក្មេងក៏អាចថាបាន។

ថ្វីដ្បិតថាខ្យងWortheniaបានផុតពូជទៅហើយ ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងសង្កេតមើលទៅលើរូបរាងខ្យងសមុទ្របច្ចុប្បន្នមួយចំនួនឃើញថាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាច្រើនជាពិសេសត្រង់សំបកដែលមានរាងថ្នាក់ៗដូចកោដ្ឋនេះតែម្តង ខុសគ្នាបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះត្រង់ខ្យងថ្មីនេះមានមាត់សំបកវែងជាងខ្យង Worthenia (រូបលេខ៨)។ តាមរយៈលក្ខណៈដូចគ្នារវាងខ្យងទាំងពីរ យើងអាចសាកល្បងពិចារណាជាបឋមថា ខ្យង Wortheniaអាចទំនងជាផុតពូជ តែក្រោយមកក៏បានវិវត្តទៅជាខ្យងថ្មីមួយទៀតដូចក្នុងរូបលេខ៨។

⁷ Mindat.Org. "Worthenia." Accessed August 9, 2026. <https://www.mindat.org/taxon-4954866.html>

សន្និដ្ឋាន

ជារួមមក ភ្នំបាក់ជាអតីតទីតាំងមួយដែលទឹកសមុទ្រធ្លាប់បានវាតទីទៅដល់ ហើយបានបន្សល់ទុកនូវភស្តុតាងសំណាកផ្លូវស៊ីលសត្វសមុទ្រជាច្រើនប្រភេទដូចបានរៀបរាប់ពីខាងលើ រួមទាំងផ្លូវស៊ីលពពួកខ្យង **Worthenia** ផងដែរដែលស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាល **Permian** មានអាយុកាលចន្លោះពី ២៩៩ - ២៥១ លានឆ្នាំមុន។ ជាការចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើង នៅក្នុងកំណត់ត្រាផ្លូវស៊ីលបានបង្ហាញថា **Worthenia** ជាខ្យងសមុទ្រមួយប្រភេទដែលធ្លាប់មានជីវិតតាំងពីសម័យកាល **Devonian** (ប្រហែល៤១៦លានឆ្នាំមុន) និងបានផុតពូជនៅសម័យកាល **Triassic** (ប្រហែល២០០លានឆ្នាំមុន) ហើយទំនងជាអាចវិវត្តចេញទៅជាខ្យងថ្មីមួយប្រភេទទៀតដែលមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលនឹងខ្យង **Worthenia** ខ្លះៗ និងបន្តរស់នៅក្នុងទឹកសមុទ្ររហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។

អរិយធម៌ខ្មែរ
KHMER CIVILIZATION

ឯកសារពិគ្រោះ

ញឹម សុផល

២០២៥, “កម្ពុជារកឃើញប្រភេទខ្យង់តោកថ្មីឈ្មោះ «ខ្យង់ឧទយាទិត្យ» នៅខេត្តបាត់ដំបង”, វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ

ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

១៩៦៧-៦៨, វចនានុក្រមខ្មែរ, ភាគ១-២, បោះពុម្ពលើកទី៥, ភ្នំពេញ

លឹម វណ្ណច័ន្ទ

២០២១, បុរេជីវៈចម្រុះ កំណត់ត្រាផ្លូវស៊ីលនៅកម្ពុជា, ភាគ១, ក្រសួងបរិស្ថាន

២០២៣, បុរេជីវៈចម្រុះ កំណត់ត្រាផ្លូវស៊ីលនៅកម្ពុជា, ភាគ២, ក្រសួងបរិស្ថាន

អ៊ីង ទ្រី, Kathe R. Jensen, វ៉ា ឡុងឌី

២០០៨, សៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍អំពីធនធានជលផលសមុទ្រនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, រដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

Britannica. “*Worthenia*.” Accessed August 15, 2026.

<https://www.britannica.com/animal/Worthenia>.

Digital Atlas of Ancient Life, “*Virtual Collection: Class Gastropoda, Paleozoic Examples*.”, n.d. Accessed August 15, 2026.

<https://www.digitalatlasofancientlife.org/vc/mollusca/gastropoda/paleozoic-gastropoda/>.

Mazaev, Alexey

2020, “*Sakmarian Gastropods from the Samarskaya Luka (Lower Permian, Volga-Urals)*.” *Paleontological Journal* 54, 1152–77.

<https://doi.org/10.1134/S0031030120100056>.

Mindat.Org. “*Worthenia*.” Accessed August 9, 2026.


<https://www.mindat.org/taxon-4616956.html>.



10 mm

រូបលេខ១៖ រូបរាងខ្យង Worthenia, ©Carnegie Museum of Natural History

ផែនទីទីតាំងស្ថានីយធូស៊ីលសត្វសមុទ្រភ្នំបាក់ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ឆ្នាំ២០២៦



រូបលេខ២៖ ផែនទីទីតាំងស្ថានីយធូស៊ីលសត្វសមុទ្រភ្នំបាក់ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ឆ្នាំ២០២៦, ផែនទីខាងលើស្តាំដែលជាទីតាំងភ្នំបាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ, ផែនទីខាងលើឆ្វេងដែលជាទីតាំងភ្នំបាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

អត្ថបទដោយ៖ លីម វណ្ណច័ន្ទ, វ៉ាន់ សុខយ៉ុង



រូបលេខ៣៖ ភ្នំបាក់មើលពីទិសខាងកើត ២០២៥



រូបលេខ៤៖ ភ្នំបាក់មើលពីទិសអាគ្នេយ៍, ២០២៥




រូបលេខ៥៖ ទីតាំងស្ថានីយមើលពីទិសខាងត្បូង, © លឹម វណ្ណច័ន្ទ ២០១៩

អត្ថបទដោយ៖ លឹម វណ្ណច័ន្ទ, វ៉ាន់ សុខយ៉ុង



អត្ថបទដោយ៖ លីម វណ្ណច័ន្ទ, វ៉ង់ សុខយ៉ុង



រូបលេខ៧៖ ផ្លូស៊ីលខ្យង Worthenia រកឃើញនៅភ្នំបាភ័, A1-A3: ខ្យង Worthenia មើលពីចំហៀង និងមើលពីលើ មានទំហំ (11.5×9.7×11.5) cm, B1-B3: ខ្យង Worthenia មើលពីចំហៀង និងមើលពីលើ មានទំហំ (2.5×2.2×2.8) cm



ਦ੍ਰੁਪ

Thais lacera (Born, 1778)

જ્યેષ્ઠ

Gyrineum natator (Röding, 1798)

រូបលេខ៨៖ ខ្យងសមុទ្របច្ចុប្បន្នដែលមានរូបរាងស្រដៀងនឹងខ្យងWorthenia, ©អ៊ីដ ទ្រី, ២០០៨, ទំ.២២

អត្ថបទដោយ៖ លឹម វណ្ណច័ន្ទ, វ៉ង់ សុខយ៉ុង